

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CIRUELO

Secadera 554

Tamaño: Pequeño.

Forma: Elíptica alargada, anchura máxima del fruto por debajo de la línea media. Ligeramente asimétrica.

Zona pistilar: Algo deprimida, asimétrica, oblicua, formando dos ligeras protuberancias desiguales o una sola ladeada. **Punto pistilar:** Pequeño o mediano, negruzco, superficial. Situado en el extremo de una ligera depresión bastante desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.

Sutura: Poco visible, línea fina, color claro, como transparente. Superficial excepto en ligera depresión en polo pistilar.

Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial. **Pedúnculo:** Corto o mediano, fino, leñoso. No se aprecia pubescencia.

Piel: Pruina escasa, muy fina, blanquecina. **Color:** Amarillo calabaza con zonas cobrizo-sonrosadas, estrías de color claro, indefinido partiendo de la cavidad peduncular. Punteado abundante con aureola carmín o cobriza.

Carne: Amarilla de color más claro que el de la epidermis, transparente. Semi-firme. **Sabor:** Muy dulce, bueno.

Hueso: Semi-libre. Pequeño, elíptico alargado. Surcos dorsal y laterales muy finos. Superficie semi-lisa con una o varias aristas salientes partiendo de la truncadura peduncular, llegando a veces hasta el extremo opuesto.

Maduración: Tercera decena de agosto (Soto de Cameros, Logroño).

